

Họ, tên thí sinh:

Mã đề thi 221

Số báo danh:

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

• Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu?

- A. $MgCl_2$. B. HNO_3 . C. HCl . D. Na_2CO_3 .

Câu 42: Crom(III) oxit là

- A. oxit trung tính. B. oxit lưỡng tính. C. oxit bazơ. D. oxit axit.

Câu 43: Poliacrilonitrin được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây?

- A. $CH_2 = CH_2$. B. $CH_2 = CH - CH = CH_2$.
C. $CH_2 = CH - CN$. D. $CH_2 = CH - Cl$.

Câu 44: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

- A. Ca. B. K. C. Ag. D. Na.

Câu 45: Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử?

- A. Saccarozơ. B. Tristearin. C. Etyl fomat. D. Alanin.

Câu 46: Al_2O_3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra $AlCl_3$?

- A. H_2SO_4 . B. HCl . C. $NaOH$. D. $NaCl$.

Câu 47: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit?

- A. CO_2 . B. SO_2 . C. O_3 . D. CH_4 .

Câu 48: Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO_3 (đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây?

- A. $Fe(NO_3)_3$. B. $Fe(OH)_2$. C. Fe_2O_3 . D. $Fe(NO_3)_2$.

Câu 49: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng sinh ra khí H_2 ?

- A. Cu. B. Ag. C. Au. D. Zn.

Câu 50: Na_2CO_3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Tên của Na_2CO_3 là

- A. natri hidrocacbonat. B. natri clorua. C. natri cacbonat. D. natri sunfat.

Câu 51: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

- A. 12. B. 11. C. 5. D. 6.

Câu 52: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch $NaOH$ thu được $C_{15}H_{31}COONa$ và $C_3H_5(OH)_3$. Công thức của X là

- A. $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$. B. $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$.
C. $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$. D. $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

Câu 53: Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

- A. Li. B. Cs. C. K. D. Na.

Câu 54: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

- A. HCl . B. $NaCl$. C. H_2SO_4 . D. $NaOH$.

Câu 55: Hợp chất CH_3NHCH_3 có tên là

- A. propylamin. B. etylmetylamin. C. dietylamín. D. dimetylamin.

Câu 56: Công thức của etyl fomat là

- A. $HCOOCH_3$. B. CH_3COOCH_3 . C. $HCOOC_2H_5$. D. $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 57: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước gọi là thạch cao sống. Công thức của thạch cao sống là

- A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$. B. CaCO_3 . C. CaSO_4 . **D. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.**

Câu 58: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

- A. Pb. B. Mg. **C. Ag.** D. Cu.

Câu 59: Andehit axetic có công thức là

- A. CH_3COOH . **B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.** C. CH_3CHO . D. HCHO .

Câu 60: Công thức hóa học của phèn chua là

- A. $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$.** B. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$.
C. $\text{Li}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$. D. $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$.

Câu 61: Thực hiện phản ứng este hóa giữa $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ với hỗn hợp CH_3COOH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ thu được tối đa bao nhiêu este hai chức?

- A. 2. B. 4. C. 3. **D. 1.**

Câu 62: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.** ✓
B. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.
C. Kim loại Al tan được trong H_2SO_4 đặc, nguội.
D. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là do CaCO_3 bị phân hủy thành CaO.

Câu 63: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch CuSO_4 1M. Giá trị của V là

- A. 50. **B. 100.** C. 200. D. 150.

Câu 64: Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ. ✓
B. Fructozơ và glucozơ là đồng phân của nhau. ✓
C. Fructozơ là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột.
D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. ✓

Câu 65: Oxi hóa hoàn toàn 11,42 gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al và Zn) bằng O_2 , thu được 17,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch H_2SO_4 loãng, thu được dung dịch chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là

- A. 47,90. B. 53,98. C. 48,66. D. 29,66.

Câu 66: Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được m kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là

- A. 360. **B. 288.** C. 72. D. 216.

Câu 67: Cho các polime sau: polietilen, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin. Số polime điều chế được bằng phản ứng trùng hợp là

- A. 2. B. 4. **C. 3.** D. 1.

Câu 68: Cho Fe_2O_3 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Thêm tiếp dung dịch NaOH vào X, thu được kết tủa Y. Công thức của Y là

- A. FeCl_3 . B. $\text{Fe}(\text{OH})_2$. C. FeCl_2 . **D. $\text{Fe}(\text{OH})_3$.**

Câu 69: Cho 8,8 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH_3OH . Tên của X là

- A. etyl axetat.** B. propyl fomat. C. metyl propionat. D. metyl axetat.

Câu 70: Khối lượng etylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl là

- A. 0,31 gam. B. 0,90 gam. **C. 0,45 gam.** D. 0,59 gam.

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

- (a) Ala-Gly-Gly có phản ứng màu biure. ✗
(b) Axit 6-aminoheptanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6. ✓
(c) Dung dịch lysin không làm chuyển màu quỳ tím. ✓
(d) Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptit. ✓
(đ) Axit glutamic có tính chất lưỡng tính. ✗

Số phát biểu sai là

- A. 4. B. 1. C. 3. **D. 2.**

Cho các phát biểu sau:

- (a) PET thuộc loại polieste.
(b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ tổng hợp.
(c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 62,5%.
(d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephthalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng hợp.
(đ) 1 mol axit terephthalic phản ứng với dung dịch NaHCO_3 dư sinh ra tối đa 1 mol CO_2 .

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

- A. 2,97. B. 4,35. C. 10,61. D. 4,91.

A. 56,1. B. 69,4. C. 40,2. D. 102,8.

$$(1) \text{E} + 2\text{NaOH} \xrightarrow{t^\circ} \text{X} + \text{Y} + \text{Z}$$


Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Trong Y, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxy.
B. Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức.
D. Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của etanol.

A. 10,91%. B. 10,77%. C. 8,70%. D. 80,38%.

Câu 77: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm.

Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 – 5 ml dung dịch H_2SO_4 loãng.

Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch $K_2Cr_2O_7$ trong H_2SO_4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều.

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bước 2, xuất hiện bọt khí không màu.

(b) Trong bước 2, kim loại sắt bị oxi hóa thành hợp chất sắt(II).

(c) Trong bước 3, hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III).

(d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị khử thành hợp chất crom(III).

(đ) Ở bước 2, nếu thay dung dịch H_2SO_4 loãng bằng dung dịch HCl thì không xuất hiện bọt khí.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 78: Hỗn hợp E gồm hai hidrocarbon mạch hở X, Y với $M_X < M_Y < 80$. Cho 0,08 mol E, có khối lượng 3,7 gam, vào lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 thu được 17,61 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 32,43%.

B. 54,05%.

C. 67,56%.

D. 45,95%.

Câu 79: Nung nóng 1,1 mol hỗn hợp X gồm N_2 và H_2 trong bình kín (xúc tác bột Fe) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H_2 bằng 5. Dẫn Y qua ống sứ chứa bột CuO (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Z và 22,8 gam hỗn hợp gồm N_2 và H_2O . Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH_3 là

A. 6,25%.

B. 16,67%.

C. 50,00%.

D. 18,75%.

Câu 80: Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại Al có màu trắng bạc, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

(b) Sục khí CO_2 đến dư vào dung dịch $NaAlO_2$ thu được kết tủa.

(c) Al_2O_3 không tác dụng được với dung dịch NaOH.

(d) Trong công nghiệp, quặng bôxít được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm.

(đ) Hỗn hợp criolit và nhôm oxit có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

----- HẾT -----